

Frontline Spray 2,5 mg/ml solução para pulverização cutânea para gatos e cães

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada 100 ml contém:

Substância activa:

Fipronil 0,25 g

FORMA FARMACÊUTICA

Solução para pulverização cutânea.

Colocar a aparência física da solução

INFORMAÇÕES CLÍNICAS

Espécie(s)-alvo

Cães e Gatos.

Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo

Para tratamento e prevenção de infestações por pulgas, carraças e piolhos mordedores:

- Eliminação de pulgas (*Ctenocephalides* spp). A eficácia insecticida contra novas infestações por pulgas recentemente adquiridas, antes de estas colocarem os ovos, persiste durante pelo menos 1 mês até 3 meses em cães, e 1 mês até 5 semanas em gatos.
- Eliminação de carraças (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp e *Ixodes* spp). O medicamento veterinário tem uma eficácia carracida persistente contra novas infestações por carraças, até 5 semanas em cães, e até 3 semanas em gatos.
- Eliminação de piolhos mordedores (*Trichodectes canis* em cães e *Felicola subrostratus* em gatos).

O medicamento veterinário pode ser administrado como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo da Dermatite Alérgica por Picada de Pulga (DAPP).

Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para utilização em animais

Pesar os animais antes da aplicação. É importante ter a certeza que os animais não se lambam entre eles após o tratamento. Para uma óptima eficácia, não é recomendado banhos ou champôs nos dois antes e após o tratamento. A ocorrência de banhos ou champôs até 4 vezes em dois meses, mostraram que não têm um efeito significativo na eficácia residual do medicamento veterinário. É recomendado um tratamento mensal quando os banhos com champôs são mais frequentes. Pode verificar-se a fixação de carraças isoladas. Por esta razão a transmissão de doenças infecciosas não pode ser completamente excluída, se as condições forem desfavoráveis. Para um controlo óptimo de infestação por pulgas e piolhos, numa casa com vários animais, todos os gatos e cães devem ser tratados simultaneamente, com um medicamento veterinário adequado. As pulgas dos animais de estimação infestam muitas vezes o cesto do animal, a cama e as áreas normais de repouso, como as alcatifas e tecidos em geral, os quais devem ser tratados, em caso de infestação massiva e ao iniciar as medidas de controlo, aplicando um medicamento veterinário adequado e aspirando regularmente. Aplicar apenas o spray directamente sobre áreas com feridas ou pele lesionada, após avaliação risco/benefício pelo médico veterinário. Evite o contacto com os olhos do animal. Em caso de contacto ocular accidental, lave imediata e abundantemente os olhos com água. Os cães não devem ser autorizados a nadar em cursos de água nos dois dias seguintes ao tratamento.

Precauções especiais que devem ser tomadas pela pessoa que administra o medicamento aos animais

Este medicamento veterinário pode causar irritação nas mucosas, na pele e nos olhos. Por isso deve ser evitado o contacto com a boca, a pele e os olhos. Deve ser evitado o contacto de animais ou pessoas com hipersensibilidade conhecida a insecticidas ou álcool com o medicamento veterinário. Deve evitar-se o contacto com os dedos. No caso de contacto lavar as mãos com água e sabão. Depois de contacto accidental com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água potável. Se a irritação ocular persistir, procure imediatamente um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo. Lavar as mãos com água e sabão após a aplicação do medicamento veterinário. Enquanto a pelagem não estiver completamente seca os animais tratados não devem ser manuseados nem se deve permitir que as crianças brinquem com eles. Por conseguinte é recomendado que os animais não sejam tratados durante o dia mas sim ao entardecer, e que os animais recentemente tratados não durmam com os donos, especialmente com as crianças. Para um controlo óptimo de infestação por pulgas e piolhos, numa casa com vários animais, todos os gatos e cães devem ser tratados simultaneamente, com um insecticida adequado. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação. Pulverizar em local bem

ventilado. Não inalar o spray. Usar luvas na aplicação do medicamento veterinário. Manter afastado das chamas ou corpos incandescentes, durante a pulverização e até que a pele esteja seca. Não expor a uma temperatura superior a 50° C. Altamente Inflamável. Irritante.

Antes de utilizar, leia o folheto informativo.

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal, Unipessoal, Lda.

Av. de Pádua, nº 11

1800-294 Lisboa

Portugal

NÚMERO(S) DE REGISTO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

381/01/11NFVPT

DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

Dezembro de 2011

DATA DA REVISÃO DO TEXTO

Janeiro 2018

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico veterinária