

Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 2-5 kg

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada pipeta de 0,5 ml contém:

Substância(s) ativa(s):

Fipronil.....	33,8 mg
Permetrina.....	252,4 mg

Excipiente(s):

Butilhidroxitolueno (E321).....	0,563 mg
---------------------------------	----------

FORMA FARMACÊUTICA

Solução para unção puntiforme. Solução límpida, incolor a amarelo-acastanhada.

INFORMAÇÕES CLÍNICAS

Espécie(s)-alvo Caninos (Cães).

Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo

Em cães: Para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas e/ou carraças, em que é necessário um efeito repelente (impede fixação/picada e consequente alimentação) contra flebótomos, moscas e/ou mosquitos.

- Pulgas: Para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides felis*) e prevenção de infestações por *Ctenocephalides canis*. Um tratamento previne novas infestações por pulgas durante 4 semanas. O medicamento veterinário pode ser administrado como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo de Dermatite Alérgica à Picada de Pulga (DAPP) quando esta tenha sido previamente diagnosticada por um médico veterinário.
- Carraças: Tratamento e prevenção de infestações por carraças (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus*). Um tratamento elimina (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) e repele (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) carraças, durante 4 semanas após o tratamento, e repele *Dermacentor reticulatus* 7 dias a 4 semanas depois do tratamento.
- Mosquitos e Flebótomos: Repele flebótomos (*Phlebotomus perniciosus*) (impede a picada e consequente alimentação) por 3 semanas e mosquitos (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*) por 4 semanas. Elimina flebótomos (*Phlebotomus perniciosus*) e mosquitos (*Aedes albopictus*) por 3 semanas.
- Moscas de estábulo: Repele (impede a picada e consequente alimentação) e elimina moscas de estábulo (*Stomoxys calcitrans*) por 5 semanas.

Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para utilização em animais: Na ausência de estudos específicos, a administração deste medicamento veterinário não é recomendada em cães com menos de 8 semanas de idade, ou em cães que pesem menos de 2 kg. Evitar o contacto do medicamento veterinário com os olhos do cão. É importante ter a certeza de que o medicamento veterinário é aplicado numa área onde o animal não possa lamber-se e garantir que outros animais não lambem os locais de tratamento após aplicação. Devido à fisiologia particular do gato que o impede de metabolizar certos compostos, incluindo a permetrina, o medicamento veterinário pode induzir convulsões potencialmente fatais nesta espécie. Em caso de exposição accidental por via cutânea, lave o gato com champô ou sabonete, e consulte imediatamente um médico veterinário. Para impedir que os gatos sejam accidentalmente expostos ao produto, mantenha os cães tratados afastados de gatos, até que o local de aplicação esteja seco. É importante assegurar que os gatos não estejam em contacto com o local de aplicação de um cão que tenha sido tratado com este medicamento veterinário. Em caso de exposição (deste tipo) procure imediatamente orientação de um médico veterinário. Não utilizar em gatos e coelhos. Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento aos animais: Este medicamento veterinário pode causar irritação cutânea e ocular, pelo que o contacto do medicamento veterinário com a pele e com os olhos deve ser evitado. Não abra a pipeta perto ou direcionada para a face. Em caso de exposição ocular ou se os olhos ficarem irritados durante a administração, lave imediatamente os olhos com bastante água. Se a irritação ocular persistir, procure um médico. Em caso de exposição cutânea ou se a pele ficar irritada durante a administração, lave imediatamente a pele com bastante água e sabão. Se a irritação da pele persistir ou voltar a ocorrer, consulte um médico. As pessoas com hipersensibilidade conhecida ao fipronil e/ou permetrina devem evitar o contacto com o medicamento veterinário. Este medicamento veterinário é nocivo, se ingerido. Evitar o contacto mão-boca. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação. Lavar as mãos após a aplicação do medicamento veterinário. Em caso de ingestão, enxaguar a boca e consultar um médico caso não se sintam bem. Uma vez que o excipiente N-metil-pirrolidona pode induzir fetotoxicidade e

teratogenicidade após exposição significativa, as mulheres grávidas devem usar luvas para evitar o contacto com o medicamento veterinário. Evitar o contacto direto com o local de aplicação. Não permitir que as crianças brinquem com os cães tratados até que o local de aplicação esteja seco. Por conseguinte, é recomendado que os cães não sejam tratados durante o dia mas sim ao entardecer, e que os animais recentemente tratados não durmam com os donos, especialmente com as crianças. Manter as pipetas armazenadas no blister original e uma vez administrada, a pipeta vazia deve ser imediatamente descartada apropriadamente, evitando futuras possibilidades de contacto. Outras Precauções: O medicamento veterinário pode afetar adversamente os organismos aquáticos. Os cães não devem ser autorizados a nadar em cursos de água nos 2 dias seguintes ao tratamento. Para uso externo. **TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO** Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal, Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11, 1800-294 Lisboa
NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 841/01/14DFVPT
DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 25 de setembro de 2014/ 16 de maio de 2019. **DATA DA REVISÃO DO TEXTO** Janeiro 2020

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico veterinária.

Leia cuidadosamente as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto informativo, em caso de dúvida ou persistência de sintomas, consulte o médico veterinário.